Fratura do Tornozelo Placa Posterior

Marcos Hideyo Sakaki

DEFINIÇÃO

- As fraturas da região do tornozelo incluem as maleolares e as do pilão tibial, sendo que as primeiras estão relacionadas a traumas rotacionais e as últimas a mecanismos de compressão axial. As fraturas que envolvem a porção posterior da superfície articular distal da tibia são comumente chamadas de fraturas do maléolo posterior e podem ser encontradas nos dois tipos de fraturas, com características um pouco diferentes como veremos mais à frente. Os objetivos deste capítulo são descrever as indicações e a técnica cirúrgica da fixação da fratura do maléolo posterior com placa.

ANATOMIA

- O maléolo posterior não é uma região anatômica claramente definida. Ele engloba o lábio posterior da tibia e graus variados da superfície articular do pilão tibial (*Figura 1*). Ele se estende desde a sindesmose tibiofibular no seu limite lateral até a região posterior do maléolo medial. Pode ser dividido em uma porção articular, orientada inferiormente e discretamente para anterior e em uma porção não-articular, que consiste na superfície posterior da epífise distal da tibia. É nessa superfície que se insere o ligamento tibiofibular posterior, responsável por 42% da estabilidade da sindesmose do tornozelo⁵. Esse ligamento tem uma direção oblíqua no sentido lateral e inferior da sua inserção no maléolo posterior, até sua inserção na fíbula posterior. (*Figura 2*)

FIGURA 1 | Maléolo posterior delineado por linha tracejada. A área da superfície articular acometida varia de acordo com o tamanho do fragmento.

FIGURA 2 | Visão posterolateral do tornozelo. A: maléolo posterior. B: ligamento tibiofibular posterior.

PATOGÊNESE

- Há dois mecanismos bem conhecidos na gênese da fratura do maléolo posterior: a rotação externa do tálus e a hiperflexão plantar:
 - A rotação externa do tálus, descrita na classificação de Lauge-Hansen, ocorre tanto no pé supinado ou pronado, e a fratura do maléolo posterior pode se instalar nas duas situações. Com a rotação externa do tálus, após ocorrer a fratura da fíbula, o maléolo lateral traciona o ligamento tibiofibular posterior, que acaba por avulsionar o maléolo posterior. Tipicamente, a porção do maléolo posterior envolvida é a posterolateral, formando um fragmento triangular, quando visualizado em um corte axial tomográfico.
 - A hiperflexão plantar do pé produz uma fratura do maléolo posterior por cisalhamento, geralmente acompanhada por fratura oblíqua do maléolo lateral, sendo que o ligamento tibiofibular posterior permanece íntegro³. O traço no maléolo posterior não se limita à região posterolateral, podendo chegar até o maléolo medial (*Figura 3*). Quando há componente de compressão axial associado, pode haver impacção ou fragmentação da superfície articular do pilão tibial e, nesses casos, a fratura pode ser classificada como uma 43 tipo B na classificação AO.

FIGURA 3 | *Visão de um corte axial de tomografia mostrando uma fratura do maléolo posterior cujo traço termina junto ao maléolo medial.*

HISTÓRIA NATURAL

- Poucas publicações tratam dos resultados, a médio prazo, das fraturas maleolares, quando a fratura do maléolo posterior está presente. Variáveis como tamanho, extensão e cominuição do fragmento, tipo de redução realizada e método de fixação dificultam a realização de estudos, com números suficientes de casos, para uma comparação significativa dos resultados. Acredita-se que a presença da fratura do maléolo posterior nas fraturas do tornozelo influencie negativamente os resultados. Tejwani et al.⁶ em um trabalho prospectivo, acompanharam 309 pacientes com fraturas maleolares tratados cirurgicamente, dos quais 54 tinham fratura do maléolo posterior. Os resultados funcionais e de dor foram piores significativamente neste grupo ao final de um ano de seguimento, mas essa diferença diminuiu ao final do segundo ano de pós-operatório.

- Apesar de não existir evidência na literatura de que a fratura do maléolo posterior seja responsável por piores resultados, a presença de um traço de fratura na superfície articular de carga da tibia distal certamente se constitui em uma lesão adicional, que merece a atenção do traumatologista quanto ao seu diagnóstico e planejamento do tratamento.

ANAMNESE E EXAME FÍSICO

- Conhecer o mecanismo de trauma é importante, pois induz o médico a suspeitar da existência de uma fratura do maléolo posterior. Temos observado que o trauma em hiperflexão plantar está presente em pacientes vítimas de acidentes de motocicleta, e nestes casos, além de ser traumatismos de alta energia, um componente de compressão axial pode estar presente.
- Os achados no exame físico, nas fraturas do maléolo posterior, são os mesmos encontrados nas fraturas maleolares em geral. Edema, equimose, crepitação, deformidade, dor à palpação dos maléolos e à movimentação da articulação do tornozelo estão presentes na maioria dos pacientes. Deve-se dar atenção especial às condições dos tecidos moles, avaliando a existência de flictenas e áreas de escoriações, que podem influenciar na escolha futura da via de acesso cirúrgica. Ferimentos com exposição da fratura não são raros nos traumas de alta energia e ocorrem nas áreas de tensão da pele, mais comumente anteromedial.

PROPEDÊUTICA

- A fratura do maléolo posterior é visualizada na radiografia de perfil do tornozelo, porém quando o fragmento é pequeno e limitado ao segmento posterolateral, pequenos graus de rotação no momento do posicionamento do tornozelo podem produzir imagens nas quais a fratura não é identificada. Na incidência de frente, quando a fratura do maléolo posterior desviada se estende até a região medial, pode-se visualizar um duplo contorno na linha que delimita a região metafisária acima do maléolo medial. (*Figura 4*)
- A tomografia computadorizada é essencial para o entendimento preciso do tamanho, localização e extensão do maléolo posterior fraturado. Deve-se avaliar também a existência de impacção da superfície articular e de fragmentos livres intra-articulares (*Figura 5*). A tomografia computadorizada muda o planejamento cirúrgico em cerca de 15% dos pacientes com fratura do maléolo posterior quando comparado à avaliação radiográfica somente.²

FIGURA 4 | Observa-se o duplo contorno acima do maléolo medial, que corresponde à extensão medial do maléolo posterior na radiografia de frente do tornozelo.

FIGURA 5 | Reconstrução sagital de tomografia computadorizada evidenciando superfície impactada do fragmento posterior.

- Em cerca de 9% dos casos de fraturas espiraladas da diáfise da tíbia, uma fratura sem desvio do maléolo posterior está presente e deve ser identificada para evitar que se desvie durante a redução e fixação da fratura diafisária.⁴

TRATAMENTO NÃO CIRÚRGICO

- O tratamento não cirúrgico das fraturas maleolares em geral está reservado àquelas sem desvio ou com desvio mínimo, sem critérios de instabilidade. O paciente deve ter o tornozelo imobilizado com uma bota, gessada ou órtese, em posição funcional, sem carga por um período inicial de duas a três semanas. Exercícios de movimentação do pé e tornozelo podem ser iniciados precocemente, assim que a melhora da dor permita. Carga parcial com auxílio de muletas é autorizada a partir da terceira semana, até a consolidação das fraturas, por volta de seis a oito semanas, quando a carga total passa a ser liberada. A reabilitação deve ser complementada com exercícios de fortalecimento e propriocepção.
- Em relação especificamente ao maléolo posterior, a não fixação pode levar a bons resultados quando o fragmento é pequeno. No entanto, não há consenso nos trabalhos da literatura em relação a qual tamanho pode ser tratado de forma não cirúrgica¹. De modo geral, fragmentos que acometem menos de 25% da superfície articular do pilão tibial podem ser negligenciados.

TRATAMENTO CIRÚRGICO

Planejamento pré-operatório

- O planejamento pré-operatório da fixação do maléolo posterior com placa tem como pontos principais a escolha da(s) via(s) de acesso e, conseqüentemente, o posicionamento do paciente na mesa cirúrgica e os implantes a serem utilizados.
- Dois métodos de fixação são utilizados na osteossíntese das fraturas do maléolo posterior: o parafuso de tração e a placa anti-cisalhante, os quais podem ser combinados. Nos casos em que o componente de cisalhamento da fratura é grande, tipicamente nos casos de fratura-luxação posterior, a utilização da placa é fundamental para manter a redução ao longo do processo de consolidação. A placa com essa função deve ser maleável e aceitar parafusos convencionais, sendo a terço de tubo a mais frequentemente utilizada.
- Podem ser usados, como parafusos de tração, o parafuso para osso esponjoso de 4mm, com rosca parcial ou o de osso cortical de 3,5mm. Nesse caso, a confecção de um túnel de deslizamento com broca 3,5mm na cortical cis é obrigatória.

Posicionamento

- O posicionamento que permite a confecção das duas vias de acesso mais utilizadas para a colocação de uma placa posterior é o ventral. No entanto, caso outras fraturas no tornozelo exijam uma via anterior, esse posicionamento não deve ser utilizado. Pacientes politraumatizados muitas vezes apresentam contra-indicações para o decúbito ventral.
- Decúbito lateral com o lado a ser operado posicionado para cima é útil para confecção da via posterolateral. O maléolo medial pode ser abordado com a rotação externa do membro inferior nos casos em que isso é necessário.
- Decúbito lateral com o lado a ser operado para baixo pode ser utilizado quando é necessária a via posteromedial. No entanto, qualquer abordagem lateral fica obstruída se este posicionamento for escolhido.

Vias de acesso

- A via posterolateral é a primeira opção, pois na maioria dos casos, não há extensão posteromedial da fratura do maléolo posterior. Ela é confeccionada entre o tendão calcâneo e os fibulares.
- A via posteromedial pode ser necessária nos casos em que a fratura, além de atingir o canto posteromedial no tornozelo, possui um traço secundário que divide o maléolo posterior em dois segmentos: um medial e outro lateral. Geralmente a via posteromedial é usada de forma complementar a uma posterolateral.

TÉCNICA OPERATÓRIA

Placa posterolateral

- Incisão retilínea de aproximadamente 7cm, à meia distância entre a fíbula e à borda lateral do tendão calcâneo.
- Dissecção cuidadosa do plano subcutâneo, identificando e protegendo o nervo sural.
- Abertura da fáscia da perna, identificando-se os tendões fibulares lateralmente e o músculo flexor longo do hálux medialmente. (*Figura 6*)
- Ao se aprofundar a dissecção nesse plano é possível identificar o foco da fratura e o maléolo posterior desviado. (*Figura 7*)
- A fratura deve ser reduzida por manipulação direta do maléolo, associada à dorsiflexão do pé.

FIGURA 6 | Identificação do plano de dissecção entre os tendões fibulares e o flexor longo do hálux.

FIGURA 7 | Identificação do traço metafisário da fratura do maléolo posterior.

O controle da redução é feito pela avaliação do contato entre as bordas da fratura na região metafisária posterior e por meio de imagens de radioscopia.

- Uma vez conseguida a redução, ela deve ser mantida com a inserção de um fio de Kirschner

(Figura 8). O local de inserção deve ser planejado de forma a não atrapalhar o posicionamento correto da placa.

- Uma placa com função anti-cisalhante deve ser hipomoldada e ter o primeiro parafuso inserido na superfície íntegra da metáfise poucos milímetros proximalmente à linha da fratura reduzida. (Figura 9)
- Nos orifícios distais ao primeiro parafuso inserido, prefere-se a utilização de parafusos de

FIGURA 8 | Controle radioscópico de fixação provisória do maléolo posterior. O maléolo lateral foi fixado previamente para facilitar a redução.

FIGURA 9 | Fixação da placa anti-cisalhante com o primeiro parafuso inserido proximalmente ao vértice da fratura.

FIGURA 10 | Placa posterior com fixação finalizada. Os dois parafusos mais distais são de tração.

tração. (Figura 10)

- Pelo menos dois parafusos são utilizados para fixação da placa no segmento proximal à fratura.
- Caso haja fratura do maléolo lateral que necessite de fixação, dissecar em um plano lateral aos tendões fibulares, abrindo a retináculo dos fibulares na sua porção mais proximal, se necessário. (Figura 11)
- Sutura do plano subcutâneo com fio absorvível 3-0 e da pele com fio de nylon 4-0.

DICAS DO AUTOR

FIGURA 11 | *Abordagem da fratura do maléolo lateral pela mesma incisão. Os tendões fibulares foram rebatidos medialmente.*

Uma placa anti-cisalhante exige a inserção de parafusos convencionais. Placas que somente aceitam parafusos bloqueados não se prestam a essa técnica.

Quando há impacção articular, o fragmento do maléolo posterior deve ser rebatido para a redução da superfície impactada. O uso de enxerto ósseo é fundamental nessas situações.

O uso de parafuso bloqueado no orifício mais inferior da placa tem risco aumentado de inserção intra-articular, pois a superfície articular distal da tibia é côncava no plano sagital.

PÓS-OPERATÓRIO

- A utilização de imobilização no período pós-operatório precoce é recomendada para prevenir a deformidade em equino do pé.
- Mobilização ativa, do tornozelo e retropé, pode ser iniciada após a melhora da dor.
- Carga parcial é estimulada após a terceira semana e a total, após a consolidação das fraturas.

COMPLICAÇÕES

- Redução insuficiente ocorre com maior frequência nos casos de impacção articular associada e nas fraturas envelhecidas.
- Sofrimento de pele pode ocorrer nos casos de múltiplas incisões com pequena distância entre elas, geralmente menor do que 5 cm.

REFERÊNCIAS

1. Van den Bekerom MPJ, Haverkamp D, Kloen P. Biomechanical and clinical evaluation of posterior malleolar fractures. A systematic review of the literature. *J Trauma* 2009;66:279-84.
2. Black EM, Antoci V, Lee JT, Weaver MJ, Johnson AH, Susarla SM, Kwon JY. Role of preoperative computed tomography scans in operative planning for malleolar ankle fracture. *Foot Ankle Int* 2013;34:697-704.
3. Gardner MJ, Boraiah S, Hentel KD, Helfet DL, Lorich DG. The hyperplantarflexion ankle fracture variant. *J Foot Ankle Surg* 2007;46:256-60.
4. Hou Z, Zhang Q, Zhang Y, Li S, Pan J, Wu H. A occult and regular combination injury: the posterior malleolar fracture associated with spiral tibial shaft fracture. *J Trauma* 2009;66:1385-90.
5. Ogilvie-Harris DJ, Reed SC, Hedman TP. Disruption of the ankle syndesmosis: biomechanical study of the ligamentous restraints. *Arthroscopy* 1994;10:558-60.
6. Tejwani NC, Pahk B, Egol KA. Effect of posterior malleolus fracture on outcome after unstable ankle fracture. *J Trauma* 2010;69:666-9.